3208013

Задача №1

Дано:	СИ	Решение:
$c = 4200 \frac{Дж}{кг \cdot °C}$		$Q_1 = Q_2$
$V_1 = 20л$	$0{,}02м^3$	$cm_1(t - t_1) = cm_2(t_2 - t)$
$t_1 = 4°C$		$cpV_1(t - t_1) = cpV_2(t_2 - t) \quad / : cp$
$p = 1000 \frac{кг}{м^3}$		$V_1(t - t_1) = V_2(t_2 - t)$
$t_1 = 40°C$		$V_2 = \frac{V_1(t - t_1)}{(t_2 - t)}$
$t = 20°C$		$V_2 = \frac{0{,}02м^3 \cdot 6°C}{20°C}$
$V_2 - ?$		$V_2 = \frac{0{,}12м^3}{20}$
		$V_2 = 0{,}006м^3$
		$V_2 = 6л.$

10г.

Ответ: $V_2 = 6л.$

Задача №2

Дано:	Решение:
$v = 3{,}6 \frac{км}{ч}$	$v = 3{,}6 \frac{км}{ч} = 1 \frac{м}{с}$
$S = 200м$	$v_2 = v_1 - v = 7 \frac{м}{с} - 1 \frac{м}{с} = 6 \frac{м}{с}$
$v_1 = 7 \frac{м}{с}$	$v_3 = v_1 + v = 7 \frac{м}{с} + 1 \frac{м}{с} = 8 \frac{м}{с}$
$t - ?$	v_2 и v_3 – относительные скорости
	$t = t_1 + t_2$
	$t = \frac{S}{v_2} + \frac{S}{v_3}$

2г.

1г.

$t = \frac{100\,м}{6\,м/с} + \frac{100\,м}{8\,м/с} = 33{,}3\,с + 25\,с = 58{,}3\,с.$

Ответ: $t = 58{,}3$ с. 10б

№3

Дано: $a = 10$ см, $\rho = 1000\,кг/м^3$, $F - ?$

Решение:

$p_1 = 3p_2$

Пусть куб погружен на некоторую глубину hм

след т.к. $p_1 = 3p_2$, то $a = 2h$ (м)

$a = 2h$

$h = \frac{a}{2}$

$h = \frac{0{,}1}{2}$ м

$h = 0{,}05$ м

$p_1 = \rho g h$

$p_1 = 1000\,кг/м^3 \cdot 10\,Н/кг \cdot 0{,}05\,м = 500\,Н/м^2 = 500$ Па

$p = \frac{F}{S}$

$F = pS$

$F = pa^2$

$F = 500\,Н/м^2 \cdot 0{,}1\,м \cdot 0{,}1\,м = 5$ Н.

Ответ: $F = 5$ Н. 10б

Задача №4

Дано: $m_2 = 5$ кг, $F - ?$

Т.к. это подвижный блок, то он дает выигрыш в силе в 2 раза, след.

$m_1 = 2m_2 = 2 \cdot 5\,кг = 10\,кг$

$F_{т1} = P_1$ 1б.

$F_{т2} = P_2$

$P_1 = mg = 100$ Н

$P_2 = 50$ Н

$P_т = P_1 + P_2 = 100\,Н + 50\,Н = 150\,Н$ $P_т = F_т$

Ответ: $F_т = 150$ Н



1	10б
2	10б
3	10б
4	1б

Член жюри: Елисеев В.С. 3 1б.
Черных О.В.
Чернова Д.С.